

REGION MIDI-PYRENEES

ÉDITION GRANDES CULTURES

Ministère de l'Agriculture SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX Rue Saint-Jean ● BP 19 ● 31130 BALMA Tél. (61) 24.06.51 PUBLICATION PÉRIODIQUE Abonnement annuel: 92 F Sous-régisseur Recettes D.D.A. Hte-Gne CCP: 8612-11 R Toulouse

1.S.S.N.: 0752-2053

BULLETIN Nº 16 DU 13 NOVEMBRE 1984

CEREALES

JAUNISSE NANISANTE DE L'ORGE

* Stades phénologiques

- l à 2 feuilles pour le blé
- 2 à 3 feuilles pour l'orge

*Situation

- Présence de pucerons dans la totalité des céréales actuellement levées
- Infestations, les plus fortes, dans les cultures de l'ARIEGE et de la HAUTE-GARONNE
- Infestations importantes dans les parcelles proches des cultures de mais

* Prévisions

 Accroissement prévisible des populations, si les conditions météorologiques actuelles se poursuivent

* Préconisations

- Intervenir sur toutes céréales atteignant le stade 2 feuilles, dès que la présence de Pucerons est notée sur 10 % ou plus des plantes.
- Utiliser un des insecticides suivants :

MATIERE ACTIVE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		FIRME	DOSE
h	NEXION EC 40	360 g/l	SOVILO	1 Uha
bromophos	SOVI NEXION 25 EM émulsion	250 g/l	SOVILO	1,5 l/ha
cypermét hrine	CYMBUSH	100 g/l	SOPRA	0,2 I/ha
	KAFIL SUPER	100 g/I	LA QUINOLEINE	0,2 I/ha
	SHERPA 10	100 g/I	RHONE-POULENC	0,2 l/ha
delt amet hrine	DECIS	25 g/l	PROCIDA	0,3 I/ha
lenvalerate	SUMICIDIN 10	100 g/I	AGRISHELL	0,25 l/ha

P21